


Plano de Vacinação Covid-19 em Ivaí

De acordo com o Plano Estadual de Vacinação contra o COVID-19 sugerido pelo Governo Estadual, o município de Ivaí vacinou até o momento,



- ✓ todos os vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19,
- ✓ hospital e serviços de urgência e emergência de referência COVID-19,
- ✓ SAMU,
- ✓ trabalhadores de Centros de Atendimento a COVID-19,
- ✓ Trabalhadores da Atenção Primária a Saúde,
- ✓ trabalhadores de laboratórios públicos e privados que realizam teste de COVID19,
- ✓ demais trabalhadores de Vigilância em Saúde,
- ✓ demais serviços públicos hospitalares e ambulatoriais,
- ✓ demais serviços hospitalares e ambulatoriais (farmácias e clínicas),
- ✓ Iniciou a vacinação dos idosos de 90 anos ou +.

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí
Prefeitura Municipal de Ivaí





Vacinas COVID-19 recebidas no município de Ivaí



Vacina CoronaVac - Instituto Butantan

É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS CoV-2. Os estudos de soroconversão da vacina adsorvida COVID-19 (Inativada), demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas 2 doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%.

Vacina covid-19 (recombinante) - Fiocruz/Astrazeneca

A vacina covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL contém 1×10^{11} partículas virais (pv) do vetor adenovírus 23 recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas. Os estudos de soroconversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram resultados em $\geq 98\%$ dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e $> 99\%$ em 28 dias após a segunda dose. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral.

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí
Prefeitura Municipal de Ivaí



Vacinas COVID-19 recebidas no Município de Ivaí

CoronaVac – SinoVac/Butantan

AstraZeneca / Fiocruz



| Vacina adsorvida covid-19 (Inativada) | |
|--|---|
| Plataforma | Vírus inativado |
| Indicação de uso | Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos |
| Forma farmacêutica | Suspensão injetável |
| Apresentação | Frascos-ampola, multidose 10 doses |
| Via de administração | IM (intramuscular) |
| Esquema vacinal/intervalos | 2 doses de 0,5 ml, intervalo entre doses de 2 à 4 semanas |
| Composição por dose | 0,5 ml contém 600SU de antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 Excipientes: hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH. |
| Prazo de validade e conservação | 12 meses, se conservado entre 2°C e 8°C |
| Validade após abertura do frasco | 8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C |
| Fonte: CGPNI/SVS/MS *Dados sujeitos a alterações | |

| Vacina covid-19 (recombinante) | |
|--|---|
| Plataforma | Vacina covid-19 (recombinante) |
| Indicação de uso | Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos |
| Forma Farmacêutica | Suspensão injetável |
| Apresentação | Frascos-ampola com 5,0 mL (10 doses) cada. |
| Via de administração | IM (intramuscular) |
| Esquema vacinal/Intervalos | 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 12 semanas |
| Composição por dose | 0,5 mL contém 1 × 10 ¹¹ partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Excipientes: L-Histidina, cloridrato de L-histidina monoidratado, cloreto de magnésio hexaidratado, polissorbato 80, etanol, sacarose, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidratado (EDTA) e água para injetáveis. |
| Prazo de validade e conservação | 24 meses a partir da data de fabricação se conservado na temperatura 2°C à 8°C |
| Validade após abertura do frasco | 6 horas após aberta sob refrigeração (2°C a 8°C) |
| Fonte: CGPNI/SVS/MS *Dados sujeitos a alterações | |

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí
Prefeitura Municipal de Ivaí




Eventos Adversos Pós Vacinação contra COVID-19

Toda e qualquer reação após a vacinação contra a COVID-19 deverá ser informada a Secretaria Municipal de Saúde, pois contamos com uma equipe treinada e capacitada para acompanhar e monitorar qualquer EAPV (Evento Adverso pós Vacinação), seguindo os protocolos de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de EAPV acordado entre Ministério da Saúde e Anvisa.

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da população relacionadas às vacinas. Estas atividades requerem notificação e investigação rápida do evento ocorrido.

Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são:

- ✓ Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos;
- ✓ Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e;
- ✓ Classificação final dos EAPV.



Se você apresentar qualquer sinal ou sintoma de reação após ter tomado a vacina contra a COVID-19, procure imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí
Prefeitura Municipal de Ivaí